

黃芪之研究

【品考】本品產日本加賀州和泉金剛山及安藝廣島等處者。名曰黃芪。產富士山前之「木黃芪」又呼「富士黃芪」根莖俱小而硬。味苦而淡。為下品。出中國陝西綿上者名「綿黃芪」。其根粗軟。折之柔如綿。內部黃白色。味甘。為上品。【原植物形態】屬豆科植物。多年生草。莖臥地或蔓狀。葉為羽狀。複葉有毛。邊緣鋸齒。七月開黃紫色或白色花。花冠為蝶形。日本名「獨草」或作「羽衣草」結莢如赤豆。根肥。大。長二三尺。入藥部分為根。色正黃如藥汁。

【性味】甘溫。

【效能】強肌表。溫分肉。實腠理。逐水利尿。

【主治】本經。癰疽久敗瘡。排膿止痛。大風癰疾。五痔鼠瘻。補虛。

藥效。主治肌表之水也。傍治身體腫。或不仁。

【方考】黃芪防已茯苓湯。治四肢腫。水氣在皮膚中。黃芪桂枝五物湯。治身體不仁。黃芪芍藥湯。治身體虛。黃芪湯。治身熱汗出而渴。又云汗沾衣。色正黃如藥汁。

【前人記載】一部謂學曰防已黃芪湯。白朮守中。黃芪行外。防已除病。甘草調劑。防已黃芪之為劑。汗劑也。黃芪能行而。不勝發。故其之任非特重於。且更以姜黃佐之。(未完)

汪醫師 中西醫藥講義

最近編輯 中西醫藥講義

▲最完備最切實用之醫書

有志醫學欲求醫道者不可不讀
有志醫學欲求醫道者不可不讀
有志醫學欲求醫道者不可不讀
有志醫學欲求醫道者不可不讀

▲講義內容

本講義凡廿四冊二千零五十九頁一百零七千餘字印刷精良絕無模糊不清之弊計廿六厚冊成一大盒歷經九版每增一版必增以新發見之學說為西醫家之參考為中醫家之大研究

▲講義科目

生理學 解剖學 病理學 內科學 傳染病學 婦科學 眼科學 藥物學
兒科學 外科學 產科學 花柳病學 皮膚病學 耳鼻喉科學 處方學 製藥學
種痘學

以上各書對於醫藥各科大致收羅無遺於醫藥界應有盡有說經雖無不詳載為臨床有益文字

▲特價

計共廿六厚冊西式裝訂原定價廿一元現承本報館朱振聲大專提倡極力勸減書價以示普及故特減為大洋八元零壹角一紙在內

上海三馬路雲南路口全福書局代售

楊志一醫士遷移診所通告

本報主筆 楊志一醫士遷移診所通告

楊志一先生向合組診所於雲南路會樂里。茲因原址不敷應用。將遷移至西藏路二馬路口平樂里八十九號。照常應診。特此通告。

本診所掛號處啟

幸福報

社儀署

期七五三第

(日一廿月七年十二國民)

分二洋售份每

口路南雲路馬三海上址館

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

閱之旁如欲入新

祖體之害及改良法

(沈熊璋)

吾國人有最失禮之事。習俗相沿。迄莫能改者。祖體是也。當夫炎帝施威。火華張空之際。試一涉足市廛。則沿途之小販工役。肆中之夥友學徒。莫不袒胸露背。一絲不掛。斯不特對人失敬。於己亦損人格。近年以來。各報對於此事。或婉言勸告。或嚴詞責備。亦已數見不鮮。然言者諄諄。聽者藐藐。曾未有一部分人改良者。蓋僅言祖體之不道德。不通祖體之不衛生。固不為世人所注意。而僅有勸止之詞。無改良之法。又奚能收圓滿之效果。今請先叙祖體之害。次及改良之法。

(甲)祖體之害

(一)祖體之不道德 吾國服制。以長衫馬褂為敬禮。今沿途小販。商店夥友。白與主顧交易。縱不長衫馬褂。亦當短襟蔽體。豈可赤裸地並妻衣而去之耶。至居家男婦。亦當衣裳整齊。蓋一旦客臨。不至遺漏無措也。

(二)祖體之不衛生 祖體不合衛生。約有數端。分述於下。

(子)衛生家言。衣服顏色冬令宜黑。夏令宜白。蓋黑色有吸熱之作用。白色有反射之功能。夏著白色。為布。光熱反射。熱度自減。若夫裸體。即失此效。炎熱自較著衣為增。(丑)祖體放出之汗臭。聞之令人不爾。

(未完)

風流小病

世上惟有少年人最快活。年紀既輕。面目又麗。水也拍得出的肌膚。再配上幾件時髦的衣服。遊逛馬路。白相堂子。其樂無窮。然而樂極每易生悲。因此有的患遺精。有的患白濁。百藥無效。痛苦萬狀。本館代售的遺精散。(專治遺精)白濁丸。(專治白濁)都是對症的特效藥。(按以上兩丸每盒壹元)上三馬路雲南路口幸福報館售

嬰兒養育上之注意

(姚伯麟)

從右之方法。假定爲調理生後八月嬰兒之乳。則可目爲造全量二十四盎司者。康利程爲四盎司。牛乳爲八盎司。拉伊讓水爲一盎司。乳糖爲一盎司。取而混合於容杯中。全量至二十四盎司。若加水則成四。〇〇脂肪質與二。〇〇蛋白質及適宜糖分之牛乳。牛乳既經調和後。直以輕火至沸騰點而熱之。殺菌後保存之。然

每日須一回或二回調和而當用其新鮮者。又在哺乳時。不能不以稍溫者予之。康利程者。人工乳之調和上。爲必要者。然其價不廉之故。非能爲任何人均可用者。故在中流以下之家庭。若欲幾分減其費用。則勢不能不求何等代用品。然康利程之代用品。得以同一之康利程而爲之。此稱爲「托普庫利程」。在乳瓶中由乳分

離者。例如將每罐送來之乳瓶。五小時放置之。則其浮於上部者爲康利程。一科托之牛乳中。含有五盎司乃至七盎司之康利程。其脂肪質豐富。較諸市場之康利程。品質劣者。雖不待論。然作哺乳用而最爲便利者。故用小勺而略取之。以爲康利程之代用品。其後所餘之牛乳。若極力振盪而用之。

(未完)

經驗良方

血症良方 (蕭熙)

凡患血症者。身體虧虛。即取柴炭之灰。(茅草諸灰均可。惟煤灰外。)約一小杯。溫水沖服。立效。
照按灰類性溫。失血過多。瘀滯已盡者。用之尤當。此法余由樓閣灰得來。去冬鄰人某。大下血不止。欲作暈厥。夜半叩門乞診。以深夜市藥不便。乃苦思得上述之方。連進二杯。逾時而止。蓋植物體莖部枝節之組成。皆含鐵之有機酸鹽類。鐵性止瀉。鐵鹽能強血。二者相作用。故有止血治瀉之功也。又按服此方時。須俟其水稍澄清。否則恐難下咽耳。

霍亂之治療及預防

沈仲圭

(丙)診斷 本病初起。與急性胃腸炎。無甚差別。此時欲辨真偽。極爲困難。惟吐瀉稍久。則真性霍亂之徵。形如米泔。以顯微鏡視之。可見其中有無數之可買菌。及腸之上皮。又真性霍亂至此程度。腹反不痛。亦足爲診斷上有有力之證據也。霍亂爲急性傳染病之一。死亡之速。(發病後約一晝夜即死)傳染之廣。言之令人色變。惟治之有方。則病來雖暴。病去亦速。爰將有效中。介紹於次。
(一)聖濟附子丸 治霍亂初起。上吐下瀉。瀉如米泔。
生附子一錢 干姜 黃連各錢半 烏梅二錢 水煎服。
(二)仲景四逆湯 治霍亂危症。脈微細。四肢厥冷。汗出如漿。
生附塊 干姜各三錢 炙甘草二錢 水煎服。
(三)仲景理中湯 治霍亂愈後。體疲胃呆。(未完)

婦女病

婦科聖藥 經期不調 經閉不通 經行腹痛 經後諸症 經前諸症 經水不調 經水過多 經水過少 經水不調 經水過多 經水過少

治諸氣神效方 (彭壽)

創製枝肉。擅食。早晨空肚生痰十枚。小兒減半。久服有奇驗。此方曾經試過多人。奏效如神。

治諸氣神效方 (彭壽)

創製枝肉。擅食。早晨空肚生痰十枚。小兒減半。久服有奇驗。此方曾經試過多人。奏效如神。

創製枝肉。擅食。早晨空肚生痰十枚。小兒減半。久服有奇驗。此方曾經試過多人。奏效如神。

創製枝肉。擅食。早晨空肚生痰十枚。小兒減半。久服有奇驗。此方曾經試過多人。奏效如神。

創製枝肉。擅食。早晨空肚生痰十枚。小兒減半。久服有奇驗。此方曾經試過多人。奏效如神。

創製枝肉。擅食。早晨空肚生痰十枚。小兒減半。久服有奇驗。此方曾經試過多人。奏效如神。

創製枝肉。擅食。早晨空肚生痰十枚。小兒減半。久服有奇驗。此方曾經試過多人。奏效如神。

創製枝肉。擅食。早晨空肚生痰十枚。小兒減半。久服有奇驗。此方曾經試過多人。奏效如神。

創製枝肉。擅食。早晨空肚生痰十枚。小兒減半。久服有奇驗。此方曾經試過多人。奏效如神。

創製枝肉。擅食。早晨空肚生痰十枚。小兒減半。久服有奇驗。此方曾經試過多人。奏效如神。

創製枝肉。擅食。早晨空肚生痰十枚。小兒減半。久服有奇驗。此方曾經試過多人。奏效如神。

創製枝肉。擅食。早晨空肚生痰十枚。小兒減半。久服有奇驗。此方曾經試過多人。奏效如神。

創製枝肉。擅食。早晨空肚生痰十枚。小兒減半。久服有奇驗。此方曾經試過多人。奏效如神。

創製枝肉。擅食。早晨空肚生痰十枚。小兒減半。久服有奇驗。此方曾經試過多人。奏效如神。

創製枝肉。擅食。早晨空肚生痰十枚。小兒減半。久服有奇驗。此方曾經試過多人。奏效如神。

創製枝肉。擅食。早晨空肚生痰十枚。小兒減半。久服有奇驗。此方曾經試過多人。奏效如神。

創製枝肉。擅食。早晨空肚生痰十枚。小兒減半。久服有奇驗。此方曾經試過多人。奏效如神。

中西醫藥研究社徵求免費研究員啓事

上海中西醫藥研究社。成立已久。社務非常發達。現爲造就中西醫藥人才起見。特徵求免費研究員。欲知章程。請寄上海郵箱二九號。當即寄奉。

傷寒病與腸室扶斯異同之研究

(劉亞農)

吾國漢唐醫書。所謂傷寒者。皆指瘟疫而言。景之傷寒論。乃包括風寒暑濕熱病而言也。凡人受病之初。常由感冒風寒。襲於皮毛。入於腠理。傳諸太陽陽明少陽諸經。爲三陽病。傳於太陰少陰厥陰諸經。爲三陰病。傳諸各經或化寒。或化熱。隨人體之素寒素熱而變化也。然傷寒之名稱。竟無人識其短長者。何哉。蓋寒者多氣也。冬時嚴寒。萬物閉藏。君子固密慎居。不易所侵。若觸冒之者。乃名傷寒。其傷於四時之氣。亦皆能爲病。惟非若冬令發厲寒毒之氣。中人者深。其不即病者。因寒氣藏於肌膚。至夏而前發爲溫病。夏至後發爲暑病。經云冬不藏精。春必病溫。

蓋不藏精則腎氣虛浮。至春夏地氣上升。觸寒觸暑。極易生病。其原因由傷寒而起也。近世西學東漸。西醫有腸室扶斯之名詞(即腸炎之通稱)乃傷寒書內之一種。素問所謂熱病者傷寒之類。仲景所謂溫熱風濕溫疫溫毒。今人所謂溫病及濕溫也。岐伯曰傷寒一日。巨陽受之(巨陽太陽也)傷寒二日。陽明受之。三日少陽受之。四日太陰受之。五日少陰受之。六日厥陰受之。仲景曰。傷寒一日。太陽受之。脈若靜者。不傳也。脈欲吐。若躁煩。脈數急者。爲傳也。故外感之邪。不必按日順序傳經也。太陽主小腸膀胱兩經。太陽傷寒。頭痛身熱。惡寒項背痠疼。或無汗而喘。陽明主大腸胃兩經。又主肉。其脈挾鼻絡於目。其病身熱惡寒煩。不得臥。或無汗。或自汗。

(未完)

地黃之研究

(續) (葉橘泉)

而復其常。血病多端。無非因邪致病。因病而虛。先解病毒。則可復其虛。如傷中血痺。吐衄崩漏。血薄悶絕。折跌精聚。皮膚燥熱。魂魄不安。驚悸胎動等。何一非血液自身中毒。瘀滯發熱而致之病。本品之能治以上諸病証者。要皆由清血消痰利水之功也。因其能含鐵質。攻逐瘀血中毒素。兼能補助其血液自身之消耗。實一純柔之血證藥物也。

(完)